

Excize a probatorní excize

Vážená paní, Vážený pane,

Na základě Vašeho aktuálního zdravotního stavu Vám byla lékařem indikována excize a probatorní excize v místní anestézii.

Co je excize:

Odstranění patologického útvaru na sliznici dutiny ústní, ve svalovině dutiny ústní a obličeje, na kůži obličeje, retní červeni nebo útvaru podkožního či podslizničního.

Anestézie:

Výkon je proveden v místní anestézii, to znamená po aplikaci anestetika do místa operace nebo po znecitlivění nervu, který inervuje danou oblast.

Alternativy výkonu:

V současné době neexistuje adekvátní alternativa k tomuto výkonu. Excize se provádí za účelem odstranění celé patologicky změněné tkáně s cílem provést histologické vyšetření, které vede ke stanovení diagnózy.

Jaké jsou možné komplikace a rizika:

Aplikace místní anestézie je spojena s celou řadou rizik a komplikací:

- hematom neboli modřina, vznikne při poranění cévy jehlou při aplikaci. Nebezpečný je velký hematom jazyka nebo pod sliznicí na vnitřní straně dolní čelisti, který je překážkou v polykání a dýchání. Terapie spočívá v aplikaci ledových obkladů, protizánětlivých léků, popř. antibiotik a léků podporujících krevní srážení,
- infekce, tj. zanesení bakterií z dutiny ústní do místa vpichu. Léčba je opět ledovými obklady, protizánětlivými léky, případně antibiotiky a v nezbytných případech chirurgická,
- dlouhotrvající anemizace z vazokonstrikce cév, tj. omezení průtoku krve danou oblastí, může vyvolat nekrotické změny, které ošetřujeme lokálně a pomocí léků,
- změna citlivosti sliznice dané oblasti po odeznění účinku anestetika je přechodného rázu a spadá do oblasti neurologie,
- poranění svalu jehlou může vést k ztíženému otevírání úst. Následuje rehabilitace, podávání protizánětlivých léků a případně antibiotik,
- z celkových komplikací může nastat alergická a toxická reakce. Při těchto komplikacích může dojít i k ohrožení fungování základních životních funkcí. Jejich léčba je komplexní, ve spolupráci s neurologem, alergologem, anesteziologem a spočívá v podání léků ve formě injekcí nebo tablet a v těžších případech i hospitalizaci pacienta.

Provedení operačního výkonu je spojeno s celou řadou rizik a komplikací:

- poškození nervů dutiny ústní, jazyka a obličeje, které se projevuje změněnou citlivostí dolního a horního rtu, brady, kůže tváře, části nosu, sliznice dutiny ústní, dásně, zubů, předních 2/3 jazyka, změnou ve vnímání chuti a omezenou hybností svaloviny dané části obličeje. Terapie probíhá ve spolupráci s neurologem, popřípadě neurochirurgem. Ve většině případů je farmakologická, rehabilitační a návrat do původního stavu je záležitostí dlouhodobou,

- další možnou komplikací je krvácení po výkonu. To je ošetřeno lokálně sešitím, prostředky podporujícími srážení krve aplikovanými lokálně nebo celkově,
- prodloužení hojení rány lokálním zánětem. Léčba spočívá v drenáži a ošetřování rány,
- poranění sliznice dutiny ústní během výkonu, rána se poté ošetří stehy nebo je ponechána hojení bez ošetření,
- poškození nebo podvaz vývodu velké slinné žlázy. Léčba spočívá v odstranění stehů, které podvazují vývod nebo v jeho přemístění na jiné místo v dutině ústní,
- méně časté komplikace jsou ovlivněny anatomickou lokalizací excidovaného útvaru.

razítko a podpis lékaře

V Ostravě dne:

.....
podpis pacienta(tky), zákonného zástupce,
opatrovníka